

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2024 №111
Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
17.05.2018г №42

О профилактических прививках

На основании части четвертой статьи 24 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

Национальный календарь профилактических прививок согласно приложению 1; перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению 2.

2. Определить, что:

2.1. профилактические прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок проводятся в определенные сроки жизни человека независимо от эпидемиологической ситуации для создания специфической невосприимчивости организма человека к соответствующим инфекционным заболеваниям;

2.2. для целей настоящего постановления под эпидемическими показаниями подразумевается:

нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (с подозрением на инфекционное заболевание), против которого проводятся профилактические прививки;

наличие при осуществлении профессиональной деятельности риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

наличие в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Беларусь или на территории ее отдельных административно-территориальных единиц, а также на территории других государств риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

наличие при возможном заносе инфекционных заболеваний на территорию Республики Беларусь риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

наличие заболеваний (состояний), при которых инфицирование возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, может привести к осложненному течению данных заболеваний (состояний) или летальному исходу;

2.3. профилактические прививки проводятся в государственных организациях здравоохранения, а также в иных, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, включающую услугу по вакцинации, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о лицензировании. Информация о проведении профилактической прививки вносится в медицинские документы пациента медицинским работником, непосредственно ее выполнившим;

2.4 при отказе пациента (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - лица, указанного в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» Республики Беларусь, 1993 г., № 24, ст.

290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460) от проведения профилактической прививки лечащим врачом должны быть разъяснены в доступной форме возможные последствия отказа от профилактической прививки. Отказ от профилактической прививки оформляется записью в медицинских документах пациента и подписывается пациентом (лицом, указанным в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении») и лечащим врачом;

- 2.5 профилактические прививки осуществляются с учетом показаний и противопоказаний к их проведению, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению (листочком-вкладышем, общей характеристикой лекарственного препарата), прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству;
- 2.6 перед проведением профилактической прививки врач-специалист проводит медицинский осмотр лица и фиксирует его результаты в медицинских документах;
- 2.7 медицинский работник организации здравоохранения, проводивший лицу профилактическую прививку, осуществляет наблюдение за ним в течение 30 минут после введения иммунобиологического лекарственного препарата;
- 2.8 При проведении профилактических прививок используются вакцины, позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации.

3. Признать утратившими силу:

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 106 «Об установлении Национального календаря профилактических прививок, перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям, порядка и сроков их проведения и признании утратившими силу постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября 2006 г. № 76 и от 8 августа 2011 г. № 78» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.08.2012, 8/26238);

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 февраля 2016 г. № 25 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 106» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.03.2016, 8/30740).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

Д.Л.Пиневич

Приложение 1 к
постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

Национальный календарь профилактических прививок

№ п/п	Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки	Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам, и сроки проведения профилактических прививок
1	Вирусный гепатит В	Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев
2	Туберкулез	Новорожденные на 3-5-й день жизни
3	Пневмококковая инфекция	Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев;
4	Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев
5	Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека	Дети (девочки) в возрасте 11 лет
6	Дифтерия, столбняк, коклюш	Дети в возрасте 18 месяцев и 6 лет
7	Полиомиелит	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет
8	Корь, эпидемический паротит, краснуха	Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет
9	Дифтерия и столбняк	Дети в возрасте 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет
10	Дифтерия	Дети в возрасте 11 лет
11	Грипп	Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет Дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями Лица с иммуносупрессией Лица в возрасте старше 65 лет Беременные женщины Медицинские, фармацевтические работники Дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания Работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения

Приложение 2 к
постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

Перечень профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям

№ п/п	Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки	Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам
1	Бешенство	<p>Лица, выполняющие работу по отлову безнадзорных животных, содержанию и разведению диких и домашних плотоядных животных.</p> <p>Охотники, лесники, егеря, работники боен, таксидермисты, грумеры, кинологи.</p> <p>Ветеринарные и зоотехнические работники.</p> <p>Работники лабораторий, работающих с диким вирусом бешенства, зараженными бешенством лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование вирусом бешенства.</p> <p>Лица, имеющие медицинские и (или) эпидемические показания к иммунизации по причине контакта с животным</p>
2	Бруцеллез	<p>Работники организаций, осуществляющих содержание и разведение, убой сельскохозяйственных животных, захоронение трупов животных, биологических остатков, продуктов убоя и мясопереработки, работники ветеринарных учреждений, зоотехнические работники (при регистрации бруцеллеза козьеовечьего вида среди животных) – до полной ликвидации в организациях либо на энзоотичной по бруцеллезу территории бруцеллеза козье-овечьего вида среди животных.</p> <p>Работники организаций, осуществляющих заготовку, хранение, переработку сырья и продуктов животного происхождения, – до полной ликвидации бруцеллеза козье-овечьего вида среди животных в организациях, из которых поступают животные, сырье и продукты животного происхождения.</p> <p>Работники лабораторий, работающих с живыми культурами возбудителя бруцеллеза козье-овечьего вида, зараженными бруцеллезом козье-овечьего вида лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование возбудителем бруцеллеза козье-овечьего вида</p>
3	Ветряная оспа	<p>Дети, которым планируется проведение операции по трансплантации органов и (или) тканей человека, при отсутствии антител или через 2 года после окончания иммуносупрессивной терапии после проведения такой трансплантации</p>
4	Вирусный гепатит А	<p>Лица, не имеющие документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании вирусным гепатитом А, и (или) сведений о наличии профилактических прививок против вирусного гепатита А, и (или) лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного уровня антител IgG к вирусу гепатита А: - находящиеся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз (подозрение на заболевание) «вирусный гепатит А»; - лица с повышенным риском заражения вирусным гепатитом А (мужчины, практикующие секс с мужчинами; трансгендерные люди)</p>

5	Вирусный гепатит В	<p>Лица, не имеющие документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании вирусным гепатитом В, и (или) сведений о наличии профилактических прививок против вирусного гепатита В, и (или) лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного уровня антител IgG к вирусу гепатита В: - относящиеся к группам с повышенным риском заражения вирусным гепатитом В, С и (или) вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфекция) (люди, употребляющие инъекционные наркотические средства и их партнеры; мужчины, практикующие секс с мужчинами, и их партнеры; лица, вступающие в сексуальные отношения на возмездной основе, и их партнеры; трансгендерные люди и их партнеры);</p> <p>лица, у которых возник аварийный контакт¹;</p> <p>контактные лица с пациентом с вирусным гепатитом В² ;</p> <p>лица, получающие медицинскую помощь с использованием крови и (или) ее компонентов, а также находящиеся на гемодиализе, с онкогематологическими заболеваниями;</p> <p>работники организаций здравоохранения, учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, имеющие контакт с биологическим материалом, потенциально содержащим вирус гепатита В;</p> <p>лица, занятые в производстве иммунобиологических лекарственных препаратов из донорской и плацентарной крови;</p> <p>обучающиеся в учреждениях образования по профилю образования «Здравоохранение»</p>
6	Гемофильная инфекция	<p>Дети в возрасте до 5 лет, ранее не получившие профилактические прививки против гемофильной инфекции и имеющие одно из следующих заболеваний или состояний:</p> <p>хронический гепатит;</p> <p>цирроз печени;</p> <p>хронические заболевания почек, сердца и легких;</p> <p>иммунодефициты;</p> <p>муковисцидоз</p>
7	Дифтерия	<p>Лица, не имеющие документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании дифтерией, и (или) сведений о наличии профилактических прививок против дифтерии в соответствии с возрастом (в том числе лица, у которых со времени последней профилактической прививки против дифтерии прошло более 5 лет,</p> <p>дети, у которых наступил срок очередной профилактической прививки против дифтерии), и (или) лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного титра (концентрации) противодифтерийных антител, находящиеся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз (подозрение на заболевание) «дифтерия»</p>
8	Желтая лихорадка	<p>Лица, выезжающие в эндемичные по желтой лихорадке страны и (или) территории стран.</p> <p>Работники лабораторий, работающих с зараженными возбудителем желтой лихорадки лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование возбудителем желтой лихорадки</p>
9	Инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2	<p>Лица в возрасте 18 лет и старше ежегодно в сентябре–декабре: с иммуносупрессией (иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфекцию, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями);</p> <p>в возрасте старше 60 лет; находящиеся и работающие в</p>

		учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Иные лица при обращении, включая детей при наличии вакцины
10	Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (далее ВПЧ-инфекция)	Девочки и женщины в возрасте от 11 до 50 лет с ВИЧ-инфекцией, ранее не привитые против ВПЧ-инфекции
11	Клещевой энцефалит	Работники, а также студенты (учащиеся), выезжающие в составе организованных групп в эндемичные территории (страны), чья профессиональная деятельность связана с выполнением лесозаготовительных (в том числе по расчистке и благоустройству леса), гидромелиоративных, строительных и других работ, при которых возможен риск заражения клещевым вирусным энцефалитом, в том числе на административно-территориальных единицах с показателем заболеваемости выше 0,05 случая на 1000 населения. Военнослужащие, лица начальствующего, рядового состава и работники органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, других войск и воинских формирований, занятые в проведении работ (несении службы) в лесистой местности
12	Корь	Лица в возрасте от 9 месяцев и старше, не имеющие документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании корью, и (или) сведений о профилактических прививках против кори, и (или) лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного уровня антител IgG к вирусу кори, находящиеся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз (подозрение на заболевание) «корь»
13	Краснуха	Лица, не имеющие документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании краснухой, и (или) сведений о профилактических прививках против краснухи, и (или) лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного уровня антител IgG к вирусу краснухи, находящиеся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз (подозрение на заболевание) «краснуха»
14	Лептоспироз	Работники организаций, осуществляющих содержание и разведение, убой сельскохозяйственных животных и (или) птицы, захоронение трупов животных и (или) птицы, биологических остатков, продуктов убоя и мясо- и (или) птицепереработки, работники ветеринарных учреждений – при регистрации случаев лептоспироза среди животных и (или) птиц в организациях. Работники организаций, осуществляющих заготовку, хранение, переработку сырья и продуктов животного происхождения, – при регистрации случаев лептоспироза среди животных и (или) птицы в организациях, из которых поступают животные и (или) птица, сырье и продукты животного происхождения. Работники лабораторий, работающих с живыми культурами возбудителя лептоспироза, зараженными лептоспирозом лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование возбудителем лептоспироза
15	Пневмококковая инфекция	Дети в возрасте до 5 лет, ранее не получившие профилактические прививки против пневмококковой инфекции и имеющие одно из следующих заболеваний или состояний: иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, хроническая болезнь почек, нефротический синдром, хронический гепатит, цирроз печени, заболевания, связанные с назначением иммуносупрессивной терапии или лучевой терапии, злокачественные новообразования, лейкозы, лимфомы, болезнь Ходжкина, после трансплантации донорского

		<p>органа, врожденный иммунодефицит, функциональная или анатомическая аспления (серповидно-клеточная анемия, другие гемоглинопатии, врожденная или приобретенная аспления); рецидивирующий острый гнойный средний отит (более 3 эпизодов в течение года);</p> <p>рецидивирующие пневмонии (3 и более эпизода);</p> <p>бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей, первичная цилиарная дискинезия, дефицит α1-антитрипсина;</p> <p>пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения;</p> <p>наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции;</p> <p>сахарный диабет;</p> <p>бронхиальная астма.</p> <p>Контактные дети в возрасте до 5 лет из очага тяжелой пневмококковой инфекции (деструктивная пневмония, менингит). Дети 5 лет и старше, взрослые, ранее не получившие профилактические прививки против пневмококковой инфекции, страдающие онкогематологическими заболеваниями</p>
16	Полиомиелит	<p>Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз (подозрение на заболевание) «полиомиелит», не имеющие документально подтвержденных сведений о профилактических прививках против полиомиелита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против полиомиелита.</p> <p>Лица, не привитые против полиомиелита, прибывшие из эпидемически неблагополучных по полиомиелиту стран или выезжающие в эпидемически неблагополучную по полиомиелиту страну</p>
17	Сибирская язва	<p>Лица, выполняющие следующие виды работ на территории стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, и (или) угрожаемой по сибирской язве территории, и (или) на территории эпизоотического очага сибирской язвы:</p> <p>работы, связанные с выемкой и перемещением грунта (ликвидация аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, благоустройство сибирезвенных захоронений, отбор проб почвы для исследования на наличие возбудителей сибирской язвы); содержание и разведение, убой сельскохозяйственных животных, утилизация трупов животных, биологических остатков, продуктов убоя и мясопереработки;</p> <p>заготовка, хранение, переработка сырья животного происхождения; ветеринарная деятельность.</p> <p>Работники лабораторий, работающих с живыми культурами возбудителя сибирской язвы, зараженными сибирской язвой лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы</p>
18	Столбняк	<p>Лица, обратившиеся за медицинской помощью в случаях:</p> <p>травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек;</p> <p>обморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степени;</p> <p>абортов и родов вне организаций здравоохранения;</p> <p>гангрены и некроза тканей любого типа;</p> <p>укусов животными</p>
19	Туляремия	<p>Лица в возрасте от 7 лет и старше, проживающие на территории активных природных очагов туляремии.</p> <p>Лица, осуществляющие работы на территории активных природных очагов туляремии:</p> <p>работники зерно- и овощехранилищ, сахарных и спиртзаводов, льнозаводов;</p>

		<p>работники организаций, осуществляющих содержание и разведение животных и (или) птицы, работающие с зерном, в кормоцехах; охотники, лица, занятые заготовкой и первичной обработкой шкур промысловых животных, в том числе работники меховых фабрик; работники сельскохозяйственных организаций, занятые на покосах, жатве;</p> <p>работники организаций, осуществляющих лесозаготовку, расчистку и благоустройство леса; работники, выполняющие отлов грызунов и кровососущих насекомых, дезинсекционные, дератизационные мероприятия.</p> <p>Работники лабораторий, работающих с живыми культурами возбудителя туляремии, зараженными туляремией лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование возбудителем туляремии</p>
20	Чума	<p>Лица, выезжающие на энзоотичные по чуме территории.</p> <p>Работники лабораторий, работающих с живыми культурами возбудителя чумы, зараженными чумой лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование возбудителем чумы</p>
21	Эпидемический паротит	<p>Лица, не имеющие документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании эпидемическим паротитом, и (или) сведений о наличии профилактических прививок против эпидемического паротита, и (или) лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного уровня антител IgG к вирусу эпидемического паротита, находящиеся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз (подозрение на заболевание) «эпидемический паротит»</p>

¹Аварийный контакт – случай, при котором биологический материал работника организации попал на поврежденные кожные покровы или слизистые оболочки пациента (потребителя или другого лица в зависимости от места возникновения аварийного контакта) и наоборот. Аварийный контакт может возникать при оказании медицинской помощи, бытовых услуг и в других ситуациях в организациях.

² Контактные лица с пациентом с вирусным гепатитом В – лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «вирусный гепатит В», у которых имеется риск реализации полового и других путей передачи вируса гепатита В, а также совместно проживающие в очаге с пациентом с вирусным гепатитом В, у которых имеется риск контактно-бытового пути передачи.